

# Hörökorvan korjaus

Ulkonevat korvalehdet ns Hörökorvat johtuvat korvaruston kehityshäiriöstä, Synnynnäinen ulkokorvan epämuotoisuus voi olla eri asteista ulkokorvan täydellisestä puuttumisesta lievään normaalin korvalehden asentohäiriöön. Tavallisimmin yksi korvalehden poimuista on jäänyt puuttumaan tai kehittynyt liian loivaksi Näitä korvan muotovirheitä korjataan kaikenikäisillä. Lapsilla pyritään hörökorvat korjaamaan juuri ennen kouluikää. Aikuisilla korjaustoimenpiteet voidaan tehdä milloin tahansa

Hörökorvaa korjaavia leikkausmenetelmiä on useampia. Leikkaus voidaan tehdä paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa ja on kestoltaan 1-2 tuntia. Pienillä lapsilla (5-6-vuotiaille) toimenpiteet tehdään nukutuksessa. Yli 10-vuotiaille ja aikuisilla leikkaus voidaan suorittaa paikallispuudutuksessa. Hörökorvaleikkaukset ulkonäköä korjaavina toimenpiteinä tehdään useimmiten yksityisen terveydenhoidon puitteissa. Sairausvakuutus osallistuu kustannuksiin vain lapsilla

Leikkauksessa muovataan rustoa korjaamalla puuttuva rustokaarre. Samalla korvalehteä lähennetään usein kalloa sulavien ompeleiden avulla. Jos koko korvalehti on kääntynyt tyvestään ulospäin, se vapautellaan pohjastaan ja ommellaan sisemmäs ja tarvittaessa poistetaan kaistale rustoa korvalehden takaa. Toimenpiteen jälkeen asetetaan pään ympärille joutava kierresidos viikoksi. Sidos edistää paranemista ehkäisemällä turvotusta ja leikkauksen jälkeisiä verenvuotoja. Ompeleet poistetaan sidevaihdon yhteydessä 7-10 päivän kuluttua. Ompeleiden poiston jälkeen on syytä käyttää pään ympärillä esimerkiksi urheilupantaa pari viikkoa.

Urheileminen on kielletty ompeleiden poistoon asti. Uiminen on sallittu pari viikkoa leikkauksesta.

Leikkausarvet paranevat yleensä hyvin. Korvienleikkauksen aiheuttama arkuus häviää muutamassa viikossa. Puolen vuoden kuluttua leikkausalueet ovat kokonaan parantuneet ja silloin leikkaustulos voidaan arvioida lopullisesti.

Mikael Relander